




Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Na het werken met dit product handen grondig wassen. Raak de ogen niet aan. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

PRODUCTINFORMATIE

Reg. nu.: NL 206818
GMP+ Reg. nu.: GMP019643
Certification nu.: αNL206818
Batch nr.: 300.....
Ten minste houdbaar tot.: ..-.-....

INHOUD: **20 liter (= 26 kg)**

Intra Mineral Zinc

VLOEIBAAR VOORMENGSEL VOOR PLUIMVEE EN VARKENS

- **Geconcentreerd zinksupplement**
- **Organisch gechelateerd voor hoge minerale biologische beschikbaarheid**
- **Eenvoudig gedoseerd, geen vooroplossing nodig**

Instructies voor gebruik

Voeg 150-250 ml Intra Mineral Zinc toe per 1000 kg voer. Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Voeg het product via de menginstallatie aan het voer toe. Zorg ervoor dat er een homogeen voermengsel ontstaat voordat het aan de dieren wordt verstrekt. Bewaar het product vorstvrij. Het wordt aangeraden om voor gebruik en voordat de toedieningsduur wordt verlengd, een voedingsspecialist of dierenarts te raadplegen. Houd bij het bepalen van de dosering altijd rekening met het zinkgehalte in het overige voer.

Productinformatie

Intra Mineral Zinc wordt toegediend wanneer extra ondersteuning in de voeding nodig is. Intra Mineral Zinc is zeer effectief dankzij het gemakkelijk opneembare zink en het brede scala aan essentiële aminozuren en organische zuren.

Doeldieren

Pluimvee en varkens.

Toevoegingsmiddelen

Verbindingen van sporenelementen: Zink als zinksulfaatmonohydraat (3b605) 100 g/l, Aminozuren: L-lysine (3c322) 266 g/l, methionine (3c301) 4,6 g/l Conserveermiddelen: Melkzuur (1a270) 43 g/l, citroenzuur (1a330) 33 g/l

Analytische bestanddelen

Vocht 50%, ruwe as 0,0%, ruw eiwit 0,0%, ruwe vezels 0,0%, ruw vet 0,0%, lysine 20,5%, methionine 0,35%, fosfor 0,0% en natrium 0,0%.

Maximale concentratie

De maximale dagelijkse hoeveelheid zink in voer voor biggen en zeugen is 150 mg/kg en voor pluimvee 120 mg/kg. Het gelijktijdig gebruik van verschillende organische zuren of hun zouten is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan in een concentratie van of nabij de maximaal toegestane waarde worden gebruikt. Bij suppletie met L-lysine, met name via drinkwater, moet rekening worden gehouden met alle essentiële en voorwaardelijk essentiële aminozuren om onevenwichtigheden te voorkomen.

Fabrikant

Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466AZ, Veghel, Nederland. Telefoonnummer: +31 (0)413 354 105



Pioneers in future proof solutions

